

DEMANDE D'OSTEODENSITOMETRIE à réaliser par

0 Service Imagerie Médicale

0 Service Rhumatologie

PRIERE DE REMPLIR CE FORMULAIRE SPECIFIANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

cachet et signature du médecin	Nom du patient
DATE :	
AGE :	TAILLE :
POIDS :	SEXE : 0 F 0 M
1 - Femme > 65 ans avec historique familial d'une fracture de hanche chez un membre de la famille au 1 ^{er} degré ou au 2 ^{ème} degré.	
2 - Quel que soit l'âge ou le sexe, au cas où un ou plusieurs des facteurs de risques suivants sont présents :	
<p>A) Fracture de la colonne vertébrale low impact non oncologique</p> <p>B) Antécédent de fracture périphérique low impact avec exclusion des fractures au niveau des doigts, des orteils, du crâne, du visage ou de la colonne cervicale.</p> <p>C) Patients ayant eu une prescription de corticothérapie équivalente à > 7,5 mg prednisolone/jour, durant plus de trois mois consécutifs.</p> <p>D) Patients cancéreux sous thérapie antihormonale ou en ménopause suite à une thérapie anticancéreuse.</p> <p>E) Patients avec au moins une des affections à risque suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polyarthrite rhumatoïde 2. Hyperthyroïdie évolutive non traitée 3. Hyperprolactinémie 4. Hypogonadisme de longue durée (orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée avec une hormone gonadotrophine-releasing (GnRH) analogue inclus) 5. Hypercalciurie rénale 6. Hyperparathyroïde primaire 7. Osteogenesis imperfecta 8. Maladie/Syndrome de Cushing 9. Anorexie nerveuse avec Body Mass Index < 19Kg/m² 10. Ménopause précoce (< 45 ans) naturelle ou provoquée 	
3 - Nouveau remboursement de l'examen DXA après 5 ans (suivant les mêmes règles d'application)	

Le protocole doit dorénavant inclure l'estimation du risque fractuaire (FRAX).

Merci dès lors d'indiquer si les risques de fracture suivants sont présents :

- Antécédent personnel de fracture (spontanée ou trauma mineur)
- Fracture de hanche chez le père ou la mère
- Tabagisme actif
- Prise de glucocorticoïde (en cours ou ancienne ≥ 5mg prednisolone/j pendant > 3 mois)
- Polyarthrite rhumatoïde
- Ostéoporose secondaire (diabète type 1, maladie chronique du foie, malabsorption)
- Consommation quotidienne ≥ 3 unités d'alcool